



Fall Planting Guide in Nepali

नेपालीमा शरद रोपण गाईड

Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी



Produce
बाली

Earliest Fall Date
प्रारम्भिक शरद मिति

Latest Fall Date
अन्तिम शरद मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Ideal Soil Temperature
आदर्शमाटो तापमान

 Beans, dry सिमी, सुक्खा	July 1 जुलाई १ आषाढ १७	August 1 अगस्त १ श्रावन १७	60-70 days 8.5-10 weeks ६० - ७० दिनहरू ८.५ - १० हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Beans, green सिमी, हरियो	July 25 जुलाई २५ श्रावन १०	August 25 अगस्त २५ भाद्र ९	60-65 days 8.5-9 weeks ६० - ६५ दिनहरू ८.५ - ९ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Beet बीटहरू	July 20 जुलाई २० श्रावन ५	September 20 सेप्टेम्बर २० असोज ४	70-75 days 10-11 weeks ७१ - ७५ दिनहरू १० - ११ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Broccoli ब्रोकोली (plants), बिरुवाहरू	August 1 अगस्त १ श्रावन १७	September 15 सेप्टेम्बर १५ भाद्र ३०	40-90 days 6-13 weeks ४० - ९० दिनहरू ६ - १३ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Brussels sprouts ब्रसेल स्प्राउट्स (plants), बिरुवाहरू	July 15 जुलाई १५ आषाढ ३१	August 15 अगस्त १५ श्रावन ३१	80-90 days 11.5-13 weeks ८० - ९० दिनहरू ११.५ - १३ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Cabbage बन्दा कोवा (plants), बिरुवाहरू	July 15 जुलाई १५ आषाढ ३१	September 1 सेप्टेम्बर १ भाद्र १६	60-100 days 8.5-14 weeks ६० - १०० दिनहरू ८.५ - १४ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Carrot गाजर	July 15 जुलाई १५ आषाढ ३१	September 15 सेप्टेम्बर १५ भाद्र ३०	60-80 days 8.5-11.5 weeks ६० - ८० दिनहरू ८.५ - ११.५ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Cauliflower फूलगोभी (plants), बिरुवाहरू	July 20 जुलाई २० श्रावन ५	September 1 सेप्टेम्बर १ भाद्र १६	50-100 days 7-14 weeks ५० - १०० दिनहरू ७ - १४ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Chard	July 15 जुलाई १५ आषाढ ३१	September 15 सेप्टेम्बर १५ भाद्र ३०	55-60 days 7.5-8.5 weeks ५५ - ६० दिनहरू ७.५ - ८.५ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस



Fall Planting Guide in Nepali

नेपालीमा शरद रोपण गाईड

Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी



Produce
बाली

Earliest Fall Date
प्रारम्भिक शरद मिति

Latest Fall Date
अन्तिम शरद मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Ideal Soil Temperature
आदर्शमाटो तापमान

Produce बाली	Earliest Fall Date प्रारम्भिक शरद मिति	Latest Fall Date अन्तिम शरद मिति	Days to Maturity परिपक्व नभएसम्म दिनहरू	Ideal Soil Temperature आदर्शमाटो तापमान
 Collard कोलार्ड्स	July 15 जुलाई १५ आषाढ ३१	September 15 सेप्टेम्बर १५ भाद्र ३०	75-90 days 10.5-13 weeks ७५ - ९० दिनहरू १०.५ - १३ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Garlic लसुन	October 1 अक्टुबर १ असोज १५	November 1 नोभेम्बर १ कार्तिक १६	180-240 days 25-32 weeks १८० - २४० दिनहरू २५ - ३२ हप्ता	50°F 10°C ५०° फरेनहाइट १०° सेल्सियस
 Kale	August 1 अगस्त १ श्रावन १७	September 15 सेप्टेम्बर १५ भाद्र ३०	50-60 days 7-8.5 weeks ५० - ६० दिनहरू ७ - ८.५ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Lettuce/ Salad लेत्तुचे, सलाद	August 15 अगस्त १५ श्रावन ३१	September 30 सेप्टेम्बर ३० असोज १४	40-50 days 5.5-7 weeks ४० - ५० दिनहरू ५.५ - ७ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Mustard Green रायोको साग	August 15 अगस्त १५ श्रावन ३१	September 30 सेप्टेम्बर ३० असोज १४	50-60 days 7-8.5 weeks ५० - ६० दिनहरू ७ - ८.५ हप्ता	68°F 20°C ६८° फरेनहाइट २०° सेल्सियस
 Onion प्याज	July 15 जुलाई १५ आषाढ ३१	August 15 अगस्त १५ श्रावन ३१	80-120 days 11.5-17 weeks ८० - १२० दिनहरू ११.५ - १७ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Radish मूला	September 15 सेप्टेम्बर १५ भाद्र ३०	October 15 अक्टुबर १५ असोज २९	20-30 days 3-4 weeks २० - ३० दिनहरू ३ - ४ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Spinach पालुंगो	September 1 सेप्टेम्बर १ भाद्र १६	October 1 अक्टुबर १ असोज १५	40-70 days 5.5-10 weeks ४० - ७० दिनहरू ५.५ - १० हप्ता	68°F 20°C ६८° फरेनहाइट २०° सेल्सियस
 Turnip शलजम	August 1 अगस्त १ श्रावन १७	October 1 अक्टुबर १ असोज १५	40-60 days 5.5-8.5 weeks ४० - ६० दिनहरू ५.५ - ८.५ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस