



Spring and Summer Planting Guide with Burmese

နှစ် ဦး နှင့် နွေရာသီစိုက်ပျိုးခြင်းလမ်းညွှန်



Central Kentucky

ဗဟို ကင်တပ်ကီ

Produce

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

Earliest Spring Date

အစောဆုံး နှစ် ဦး နှင့်

Latest Summer Date

ပိုင်းခြားသည့် နွေရာသီ နှင့် စွဲ

Days to Maturity

ရင့်ကျက်သည် အထိ နှစ်ရက်များ

Ideal Soil Temperature


အကောင်းဆုံး မြေဆီလွှာ အပူချိန်

Produce ဟင်းသီးဟင်းရွက်	Earliest Spring Date အစောဆုံး နှစ် ဦး နှင့်	Latest Summer Date ပိုင်းခြားသည့် နွေရာသီ နှင့် စွဲ	Days to Maturity ရင့်ကျက်သည် အထိ နှစ်ရက်များ	Ideal Soil Temperature အကောင်းဆုံး မြေဆီလွှာ အပူချိန်
 Basil ပင်စိမ်းမွှေး (plants), (အပင်များ)	May 5 မေ ၅	June 15 ဇွန် ၁၅	60-90 days 8.5-13 weeks ၆၀-၉၀ ရက်ပေါင်း ၈.၅-၁၃ ရက်သတုတပတ်များ	70°F 21°C ၇၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Beans, dry ပဲခဲကြက်	May 5 မေ ၅	June 5 ဇွန် ၅	60-70 days 8.5-10 weeks ၆၀-၇၀ ရက်ပေါင်း ၈.၅-၁၀ ရက်သတုတပတ်များ	77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Beans, green ပဲစိမ်း	April 25 ဧပြီ ၂၅	August 15 ဩဂုတ် ၁၅	60-65 days 8.5-9 weeks ၆၀-၆၅ ရက်ပေါင်း ၈.၅-၉ ရက်သတုတပတ်များ	77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Beet မုံလာဥနှီ	March 15 မတ် ၁၅	April 15 ဧပြီ ၁၅	70-75 days 10-11 weeks ၇၀-၇၅ ရက်ပေါင်း ၁၀-၁၁ ရက်သတုတပတ်များ	86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Broccoli ဘရိုကိုလီ (plants), (အပင်များ)	April 5 ဧပြီ ၅	May 5 မေ ၅	40-90 days 6-13 weeks ၄၀-၉၀ ရက်ပေါင်း ၆-၁၃ ရက်သတုတပတ်များ	77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Brussels sprouts ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက် (plants), (အပင်များ)	April 5 ဧပြီ ၅	May 5 မေ ၅	80-90 days 11.5-13 weeks ၈၀-၉၀ ရက်ပေါင်း ၁၁.၅-၁၁.၅ ရက်သတုတပတ်များ	77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Cabbage ဂေါဖီထုပ် (plants), (အပင်များ)	March 25 မတ် ၂၅	April 25 ဧပြီ ၂၅	60-100 days 8.5-14 weeks ၆၀-၁၀၀ ရက်ပေါင်း ၈.၅-၁၄ ရက်သတုတပတ်များ	86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Carrot မုန်လာဥနှီ	March 20 မတ် ၂၀	April 20 ဧပြီ ၂၀	60-80 days 8.5-11.5 weeks ၆၀-၈၀ ရက်ပေါင်း ၈.၅-၁၁.၅	77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်



Spring and Summer Planting Guide with Burmese

နှစ် ဦး နှင့် နွေရာသီစိုက်ပျိုးခြင်းလမ်းညွှန်



Central Kentucky

ဗဟို ကင်တပ်ကီ

Produce

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

Earliest Spring Date

အစောဆုံးနှစ် ဦး နှစ်

Latest Summer Date









ပိုခြံသည့်နှစ်ရာသီနုစွဲ

Days to Maturity

ရင့်ကျက်သည့်အထိနုစွဲရက်များ

Ideal Soil Temperature


အကောင်းဆုံးမမြေဆီလွှာအပူချိန်

 Cauliflower ပန်းဂေါဖီ (plants), (အပင်များ)	April 5 ဧပြီ ၅	May 5 မေ ၅	50-100 days 7-14 weeks ၅၀-၁၀၀ ရက်ပေါင်း ၇-၁၄ ရက်သတုတပတ်များ	77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Chard Chard	March 20 မတ် ၂၀	May 20 မေ ၂၀	55-60 days 7.5-8.5 weeks ၅၅-၆၀ ရက်ပေါင်း ၇.၅-၈.၅ ရက်သတုတပတ်များ	86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Cilantro Cilantro	March 20 မတ် ၂၀	April 20 ဧပြီ ၂၀	60-80 days 8.5-11.5 weeks ၆၀-၈၀ ရက်ပေါင်း ၈.၅-၁၁.၅	65°F 18°C ၆၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၁၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Collard greens Collard greens	March 10 မတ် ၁၀	April 30 ဧပြီ ၃၀	75-90 days 10.5-13 weeks ၇၅-၉၀ ရက်ပေါင်း ၁၀.၅-၁၃	77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Corn ပဲခူးဖူး	April 20 ဧပြီ ၂၀	July 10 ဇူလိုင် ၁၀	60-100 days 8.5-14 weeks ၆၀-၁၀၀ ရက်ပေါင်း ၈.၅-၁၄ ရက်သတုတပတ်များ	95°F 35°C ၉၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Cucumber သခွားသီး	May 1 မေ ၁	July 1 ဇူလိုင် ၁	45-65 days 6.5-9.5 weeks ၄၅-၆၅ ရက်ပေါင်း ၆.၅-၉.၅ ရက်သတုတပတ်များ	95°F 35°C ၉၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Eggplant ခရမ်းသီး (plants), (အပင်များ)	May 10 မေ ၁၀	June 15 ဇွန် ၁၅	60-75 days 8.5-10.5 weeks ၆၀-၇၅ ရက်ပေါင်း ၈.၅-၁၀.၅ ရက်သတုတပတ်များ	86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
 Kale ကိုက်လန်	March 20 မတ် ၂၀	May 5 မေ ၅	50-60 days 7-8.5 weeks ၅၀-၆၀ ရက်ပေါင်း ၇-၈.၅ ရက်သတုတပတ်များ	86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်



Spring and Summer Planting Guide with Burmese

နှစ် ဦး နှင့် နွေရာသီစိုက်ပျိုးခြင်းလမ်းညွှန်



Central Kentucky

ဗဟို ကင်တပ်ကီ

Produce

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

Earliest Spring Date

အစောဆုံး နှစ် ဦး နှင့်

Latest Summer Date

ပိုင်းခြားသည့် နွေရာသီ နှင့် စွဲ

Days to Maturity

ရင့်ကျက်သည် အထိ နှစ်ရက်များ

Ideal Soil Temperature


အကောင်းဆုံး မြေအပူချိန်

 <p>Leek ကက်ြသွန်မိတ်ြ</p>	<p>March 10 မတ် ၁၀</p>	<p>April 10 ဧပြီ ၁၀</p>	<p>180-240 days 25-32 weeks ၁၈၀-၂၄၀ ရက်ပေါင်း ၂၅-၃၂ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>68°F 20°C ၆၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Lettuce ဆလတ်ရွက်</p>	<p>March 25 မတ် ၂၅</p>	<p>May 5 မေ ၅</p>	<p>40-50 days 5.5-7 weeks ၄၀-၅၀ ရက်ပေါင်း ၅.၅-၇ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Melons ဖရဲသီး</p>	<p>May 1 မေ ၁</p>	<p>July 1 ဇူလိုင် ၁</p>	<p>45-65 days 6.5-9.5 weeks ၄၅-၆၅ ရက်ပေါင်း ၆.၅-၉.၅ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>70°F 21°C ၇၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Mustard Greens မုန်ညှင်းအစိမ်း</p>	<p>March 1 မတ် ၁</p>	<p>May 1 မေ ၁</p>	<p>35-60 days 4.5-8.5 weeks ၃၅-၆၀ ရက်ပေါင်း ၄.၅-၈.၅ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>68°F 20°C ၆၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Okra ရုံးပတီ</p>	<p>May 10 မေ ၁၀</p>	<p>July 15 ဇူလိုင် ၁၅</p>	<p>50-80 days 7-11.5 weeks ၅၀-၈၀ ရက်ပေါင်း ၇-၁၁.၅ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>95°F 35°C ၉၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Onions, bulb ကက်ြသွန်မီးသီးများ</p>	<p>March 20 မတ် ၂၀</p>	<p>April 20 ဧပြီ ၂၀</p>	<p>80-120 days 11.5-17 weeks ၈၀-၁၂၀ ရက်ပေါင်း ၁၁.၅-၁၇ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Onion, green ကက်ြသွန်အစိမ်း</p>	<p>March 10 မတ် ၁၀</p>	<p>April 10 ဧပြီ ၁၀</p>	<p>40-60 days 5.5-8.5 weeks ၄၀-၆၀ ရက်ပေါင်း ၅.၅-၈.၅ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Parsley နံနံပင်</p>	<p>March 25 မတ် ၂၅</p>	<p>May 5 မေ ၅</p>	<p>40-50 days 5.5-7 weeks ၄၀-၅၀ ရက်ပေါင်း ၅.၅-၇ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>



Spring and Summer Planting Guide with Burmese

နှစ် ဦး နှင့် နွေရာသီစိုက်ပျိုးခြင်းလမ်းညွှန်



Central Kentucky

ဗဟို ကင်တပ်ကီ

Produce

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

Earliest Spring Date

အစောဆုံးနှစ် ဦး နှစ်

Latest Summer Date

ပိုင်းခြားသည့် နွေရာသီ နှစ်စွဲ

Days to Maturity

ရင့်ကျက်သည်အထိ နှစ်ရက်များ

Ideal Soil Temperature


အကောင်းဆုံး မြေအပူချိန်

Produce ဟင်းသီးဟင်းရွက်	Earliest Spring Date အစောဆုံးနှစ် ဦး နှစ်	Latest Summer Date ပိုင်းခြားသည့် နွေရာသီ နှစ်စွဲ	Days to Maturity ရင့်ကျက်သည်အထိ နှစ်ရက်များ	Ideal Soil Temperature အကောင်းဆုံး မြေအပူချိန်
 <p>Peas ပဲစေ့တွဟော</p>	<p>March 1 မတ် ၁</p>	<p>April 1 ဧပြီ</p>	<p>40-60 days 5.5-8.5 weeks ၄၀-၆၀ ရက်ပေါင်း ၅.၅-၈.၅ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Peppers ငရုတ်ကောင်း (plants), (အပင်များ)</p>	<p>May 10 မေ ၁၀</p>	<p>July 1 ဇူလိုင် ၁</p>	<p>65-75 days 9.5-10.5 weeks ၆၅-၇၅ ရက်ပေါင်း ၉.၅-၁၀.၅ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Potato အာလူး</p>	<p>March 15 မတ် ၁၅</p>	<p>July 1 ဇူလိုင် ၁</p>	<p>90-140 days 13-20 weeks ၉၀-၁၄၀ ရက်ပေါင်း ၁၃-၂၀ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>50°F 10°C ၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Pumpkin ရွှေဖရုံသီး</p>	<p>May 5 မေ ၅</p>	<p>June 15 ဇွန် ၁၅</p>	<p>90-120 days 13-17 weeks ၉၀-၁၂၀ ရက်ပေါင်း ၁၃-၁၇ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Radish မုန်လာဥနှီ</p>	<p>March 10 မတ် ၁၀</p>	<p>May 5 မေ ၅</p>	<p>20-30 days 3-4 weeks ၂၀-၃၀ ရက်ပေါင်း ၃-၄ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Salad Mix အသုပ်ရောနှော</p>	<p>March 25 မတ် ၂၅</p>	<p>May 5 မေ ၅</p>	<p>40-50 days 5.5-7 weeks ၄၀-၅၀ ရက်ပေါင်း ၅.၅-၇ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>77°F 25°C ၇၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Summer Squash နှစ်ရာသီစကွပ် ရှ်</p>	<p>May 10 မေ ၁၀</p>	<p>August 1 ဩဂုတ် ၁</p>	<p>55-65 days 7.5-9.5 weeks ၅၅-၆၅ ရက်ပေါင်း ၇.၅-၉.၅ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>95°F 35°C ၉၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Spinach ဟင်းနုနွယ်ရွက်</p>	<p>March 1 မတ် ၁</p>	<p>April 15 ဧပြီ ၁၅</p>	<p>40-70 days 5.5-10 weeks ၄၀-၇၀ ရက်ပေါင်း ၅.၅-၁၀ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>68°F 20°C ၆၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>



Spring and Summer Planting Guide with Burmese

နှစ် ဦး နှင့် နွေရာသီ စိုက်ပျိုးခြင်း လမ်းညွှန်



Central Kentucky

ဗဟို ကင်တပ်ကီ

Produce

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

Earliest Spring Date

အစောဆုံး နှစ် ဦး နှင့်

Latest Summer Date


ပိုင်းခြားသည့် နွေရာသီ နှင့် စွဲ

Days to Maturity

ရင့်ကျက်သည် အထိ နှစ်ရက်များ

Ideal Soil Temperature

အကောင်းဆုံး မြေအပူချိန်

 <p>Sweet potato ကန်စွန်းဥ</p>	<p>May 10 မေ ၁၀</p>	<p>June 10 ဇွန် ၁၀</p>	<p>120-140 days 17-20 weeks ၁၂၀-၁၄၀ ရက်ပေါင်း ၁၇-၂၀ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>75°F 24°C ၇၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Tomatoes ခရမ်းချဉ်သီး (plants), (အပင်များ)</p>	<p>May 5 မေ ၅</p>	<p>June 15 ဇွန် ၁၅</p>	<p>60-90 days 8.5-13 weeks ၆၀-၉၀ ရက်ပေါင်း ၈.၅-၁၃ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>55°F 13°C ၅၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၁၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Turnip မုန်လာဥဝါ</p>	<p>March 10 မတ် ၁၀</p>	<p>April 10 ဧပြီ ၁၀</p>	<p>40-60 days 5.5-8.5 weeks ၄၀-၆၀ ရက်ပေါင်း ၅.၅-၈.၅ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>86°F 30°C ၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Watermelon ဖရဲသီး</p>	<p>May 5 မေ ၅</p>	<p>July 1 ဇူလိုင် ၁</p>	<p>70-90 days 10-13 weeks ၇၀-၉၀ ရက်ပေါင်း ၁၀-၁၃ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>95°F 35°C ၉၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Winter Squash ဆောင်းရာသီစ ကွပ်ရှီ</p>	<p>May 5 မေ ၅</p>	<p>June 15 ဇွန် ၁၅</p>	<p>90-120 days 13-17 weeks ၉၀-၁၂၀ ရက်ပေါင်း ၁၃-၁၇ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>70°F 21°C ၇၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>
 <p>Zucchini သခွားဖရုံသီး</p>	<p>May 10 မေ ၁၀</p>	<p>August 1 ဩဂုတ် ၁</p>	<p>55-65 days 7.5-9.5 weeks ၅၅-၆၅ ရက်ပေါင်း ၇.၅-၉.၅ ရက်သတုတပတ်များ</p>	<p>70°F 21°C ၇၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ၂၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်</p>